

グレースシア乳剤が、
「ほうれんそう」に
使えるようになった！

大切な作物が食害される前に駆除できる。
速く効く殺虫剤・グレースシア乳剤が
「ほうれんそう」に適用拡大しました！

農業用散布殺虫剤

売上No.1^{*1}

速く効く。あの害虫^{*1}にも効く。だから、収量に差^{*2}がつく。

野菜・
茶用
殺虫剤

グレースシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合 ■殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ類、ハスモンヨトウの同時防除が可能 ■葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治



^{*1} 農業要覧2024より、農業用散布殺虫剤として。^{*2} 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。^{*3} 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。[®]は日産化学(株)の登録商標

適用害虫と使用方法

使用上の注意事項（抜粋） ●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。 ●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
さといも	ハダニ類	2000倍				
	ハスモンヨトウ					
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ	2000～3000倍		収穫7日前まで	2回以内	
やまのいも	ハスモンヨトウ					
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ	2000倍		収穫前日まで		
だいこん						
はつかだいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ				1回	
にんじん	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	2000～3000倍		収穫7日前まで	2回以内	
結球あぶらな科葉菜類※1、はなやさい類※2	コナガ、アオムシ、ウワバチ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ、アザミウマ類	3000倍			1回	
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍		収穫3日前まで		
しゅんぎく	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ			収穫7日前まで		
ほうれんそう	アザミウマ類、ハスモンヨトウ			収穫3日前まで	2回以内	
しそ科葉菜類（えごま（葉）を除く）、しそ（花穂）	アザミウマ類	2000倍				
鱈葉類（根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く）※3	ハモグリバエ類	2000～3000倍				無人航空機による散布
	アザミウマ類	20倍	2.0ℓ/10a	収穫7日前まで		
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a		本剤2回以内	フルキサメタミド※4 （苗浸漬は1回以内、 株元灌注は1回以内、 散布は2回以内）
	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫21日前まで	本剤：1回	株元灌注
			-	植付時	本剤：1回	30分間苗浸漬
にら	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類		1ℓ/㎡	収穫14日前まで	本剤：1回	株元灌注
ヤングコーン				収穫7日前まで	本剤：1回	
未成熟とうもろこし	ハダニ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a		1回	
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ					
ピーマン及びとうがらし類	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ					
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類	2000倍		収穫前日まで		
うり類（未成熟）※4	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類		100～300ℓ/10a			
うり類（成熟、ただし、すいか、メロンを除く）※5	アザミウマ類					
すいか、メロン	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類				2回以内	散布
豆類（種実、ただし、だいず、あずき、らっきょうを除く）	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類					
あずき	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類			収穫14日前まで		
だいず	アザミウマ類、マメシロイシ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類	2000～3000倍				
えだまめ	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類					
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類					
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ	2000倍	100～500ℓ/10a	収穫前日まで		
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ		100～300ℓ/10a			
しょうが	ハスモンヨトウ	2000～3000倍				
	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫30日前まで	本剤2回以内	フルキサメタミド※4 5回以内 （種球への処理は 1回以内、 株元灌注は2回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内）
	ホモノハダニ	1000倍	-	植付前	本剤：1回	株元灌注
らっきょう	ハモグリバエ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	本剤2回以内	散布
	アザミウマ類	20倍	2.0ℓ/10a			無人航空機による散布
	ハモグリバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	本剤：1回	フルキサメタミド※4 2回以内 （鱗片への処理は 1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計1回以内）
にんにく	アザミウマ類	20倍	2.0ℓ/10a			無人航空機による散布
	チュウリップサビダニ		100～300ℓ/10a			散布
		2000倍	-	植付前	本剤：1回	120分間鱗片浸漬
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャゲコナジラミ	2000～3000倍	200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回	
いちじく	アザミウマ類		200～700ℓ/10a	収穫前日まで		
食用ぎく				収穫3日前まで		
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	発生初期	2回以内	散布
きく（葉）				収穫14日前まで		
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類			発生初期		
ゆり	ネダニ類	2000～3000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

※1 結球あぶらな科葉菜類：キャベツ、はくさい、メキャベツ ※2 はなやさい類：ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー ※3 鱈葉類（根物）：たまねぎ、葉たまねぎ、食用ゆり、葉にんにく、のびる、ベルギーエシャロットなど ※4 うり類（未成熟）：きゅうり、きゅうり（花）、ズッキーニ、ズッキーニ（花）、にがうり、赤毛ウリ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、とうがん、はやとうり、ゆうが、エホバウ ※5 うり類（成熟）：かぼちゃ、まくわうり、漬物用まくわうり、漬物用メロン、漬物用すいか、ツノニガウリなど

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2025年9月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)最新の
製品情報は
こちら