「多品目栽培」だったら、グレーシア。

多彩な作物に登録があり、
さまざまな種類の害虫に効く。
多品目を栽培している
生産者の方におすすめします。

野菜・茶用殺虫剤

速く効く。あの害虫[*1]にも効く。
だから、収量に差[*2]がつく。

グレーシア®乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合。幅広いチョウ目害虫に卓効
- 殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ、コナジラミ、ハダニ類などの同時防除も可能[*1]
- ミツバチ、マルハナバチは翌日導入可能

＊1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧下さい。　＊2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。
®は日産化学(株)の登録商標

速く効く。あの害虫にも効く。

グレーシア®乳剤

農林水産省登録：第24185号
有効成分：フルキサメタミド…10.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
容量：100mℓ入、250mℓ入、500mℓ入、5ℓ入

適用害虫と使用方法

＊本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数＊		使用方法
さといも	ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		散布
	ハスモンヨトウ	2000～3000倍					
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ						
やまのいも	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで			
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ			収穫7日前まで			
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ	2000～3000倍					
キャベツ、はくさい、はなやさい類（ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー）	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ						
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ、アザミウマ類	3000倍			1回		
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍		収穫3日前まで	2回以内		
しそ科葉菜類（えごま〈葉〉を除く）、しそ（花穂）	アザミウマ類	2000倍					
鱗茎類（根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く）＃ ＃鱗茎類（根物）とは、たまねぎ、葉たまねぎ、食用ゆり、葉にんにく、のびる、ベルギーエシャロットなど	ハモグリバエ類	2000～3000倍		収穫7日前まで			
	アザミウマ類	20倍	2.0ℓ/10a				無人航空機による散布
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a		本剤2回以内	フルキサメタミド：4回以内（苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内）	散布
	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫21日前まで	本剤：1回		株元灌注
			-	植付時	本剤：1回		30分間苗浸漬
にら			1ℓ/㎡	収穫14日前まで	本剤：1回	フルキサメタミド：2回以内（株元灌注は1回以内、散布は1回以内）	株元灌注
	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	本剤：1回		散布
ヤングコーン	ハダニ類	2000～3000倍		収穫前日まで	1回		
未成熟とうもろこし							
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ	2000倍			2回以内		
ピーマン及びとうがらし類	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ						
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類						
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類						
すいか、メロン	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類						
豆類（種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く）	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	2000～3000倍		収穫14日前まで			
あずき	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類						
だいず	アザミウマ類、マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類						
えだまめ							
豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類			収穫前日まで			
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類	2000倍	100～500ℓ/10a				
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ						
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ		100～300ℓ/10a				
しょうが	ハスモンヨトウ	2000～3000倍					
らっきょう	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫30日前まで	本剤2回以内	フルキサメタミド剤：5回以内（種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）	株元灌注
		1000倍	-	植付前	本剤：1回		30分間種球浸漬
	ホモノハダニ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	本剤2回以内		散布
	ハモグリバエ類	2000～3000倍					
	アザミウマ類						
		20倍	2.0ℓ/10a				無人航空機による散布
にんにく	ハモグリバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	本剤：1回	フルキサメタミド剤：2回以内（鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内）	散布
	アザミウマ類						
		20倍	2.0ℓ/10a				無人航空機による散布
	チューリップサビダニ	2000倍	100～300ℓ/10a				散布
			-	植付前			120分間鱗片浸漬
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ		200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回		散布
	サビダニ類、チャノホコリダニ	2000～3000倍					
いちじく	アザミウマ類	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内		
食用ぎく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類		100～300ℓ/10a	収穫3日前まで			
きく				発生初期			
きく（葉）				収穫14日前まで			
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類			発生初期			
ゆり	ネダニ類	2000～3000倍	-	植付前	1回		30分間種球浸漬

使用上の注意事項（抜粋）●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

最新の製品情報はこちら

本資料は2024年12月現在の登録内容に基づいています。

日産化学株式会社
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
ホームページ https://www.nissan-agro.net/
お客様窓口 TEL.03-4463-8271（9:00～17:30 土日祝日除く）