

小麦、大麦に 適用拡大!!

しつこい雑草を、素早く枯らし、長く抑える。

非選択性茎葉処理除草剤

ザクサ

液剤



除草剤分類 10

CHIRAL SWITCH 新技術キラルスイッチで
様々な雑草に強く効く!!



ザクサは三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の登録商標です。 農林水産省登録 第22901号



特長

- スギナ、ツユクサなど、ほとんどの雑草を枯らしします。
- 早く枯らし、長く雑草の発生を抑えます。
- 有効成分のグルホシネートPナトリウム塩は土壌中で速やかに分解されます。

■適用雑草と使用方法※1

有効成分:グルホシネートPナトリウム塩・・・11.5% 人畜毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数※2	
			薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)	本剤	グルホシネート及び グルホシネートP
果樹類 (かんきつ、りんご、 びわ、いちじょう(種子)、 くり、キウイフルーツ、 食用桑(果実)、 さんしょう(果実)を除く)	一年生雑草	収穫前日まで	300~500			
	多年生雑草		500~1000			
かんきつ りんご びわ キウイフルーツ	一年生雑草	収穫21日前まで	300~500		3回以内	3回以内
	多年生雑草		500~1000			
くり	一年生雑草	収穫30日前まで	300~500			
	多年生雑草		500~1000			
いちじょう(種子)	一年生雑草	収穫14日前まで	300~500			
	多年生雑草		500~1000			
食用桑(果実)	一年生雑草	収穫45日前まで (春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前)	300~500			
	多年生雑草		500~1000			
さんしょう(果実)	一年生雑草	収穫7日前まで	300~500		2回以内	2回以内
	多年生雑草		500~1000			
そば	雑草生育期	は種前				
		収穫28日前まで (は種・定植前又は畦間処理)				
豆類 (種実、ただし らっかせいを除く)		収穫前日まで (は種・定植前又は畦間処理)	300~500		3回以内	3回以内
豆類 (未成熟、ただし えだまめを除く)		収穫14日前まで (は種・定植前又は畦間処理)				
えだまめ		萌芽前処理	100~200	100 s 150	1回	3回以内 (萌芽前は 1回以内、 萌芽後は 2回以内)
ばれいしよ		収穫21日前まで (畦間処理)			2回以内	
さといも		収穫30日前まで (種付前又は畦間処理)			3回以内	3回以内
さといも(葉柄)		収穫7日前まで (種付前又は畦間処理)				
かんしょ	一年生雑草	収穫30日前まで (種付前又は畦間処理)				
ごぼう		収穫前日まで (は種前又は畦間処理)			2回以内	2回以内
だいこん		収穫45日まで (畦間処理)				
やまのいも		収穫30日前まで (萌芽前又は畦間処理)	300~500			
いちご きゅうり なす ピーマン トマト ミニトマト とうがらし類		収穫前日まで (定植前又は畦間処理)			3回以内	3回以内
メロン レタス 非結球レタス		収穫30日前まで (定植前又は畦間処理)			2回以内	2回以内
はくさい		収穫45日前まで (は種・定植前又は畦間処理)				
キャベツ		収穫45日前まで (定植前又は畦間処理)				
たまねぎ		収穫7日前まで (定植前又は畦間処理)				2回以内
にんにく		収穫前日まで (萌芽前又は畦間処理)				3回以内
にら		収穫前日まで(畦間処理)				2回以内
ねぎ すいか ブロッコリー		収穫前日まで (定植前又は畦間処理)				2回以内
アスパラガス	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	萌芽前 収穫前日まで(畦間処理)	500			2回以内
にんじん		収穫7日前まで (は種前又は畦間処理)		100 s 150	3回以内	3回以内
ほうれんそう		定植前			3回以内	3回以内
とうがん		収穫前日まで(畦間処理)				2回以内
しそ		収穫14日前まで(畦間処理)				2回以内
みょうが(花穂)		収穫14日前まで (萌芽前又は畦間処理)				2回以内
みょうが(茎葉)	一年生雑草	みょうが(花穂)の 収穫14日前まで ただし、花穂を収穫しない場合 にあつては開花期終了まで (萌芽前又は畦間処理)	300~500			2回以内
ぎぼうし		収穫90日前まで(畦間処理)			3回以内	3回以内
かのこそう		収穫14日前まで (定植前又は畦間処理)			9回以内 (1年間に 3回以内)	9回以内 (1年間に 3回以内)
甘草		は種又は定植9日前まで 収穫21日前まで (畦間処理)	500	100	1回	3回以内 (は種又は 定植後は 2回以内)
ごま		収穫3日前まで(畦間処理)	300~500	100~150	3回以内	3回以内
ホップ		耕起又は種付7日前まで 収穫14日前まで(畦間処理)	300~1000	100	1回	4回以内 (種後は 3回以内)
さとうきび	一年生雑草 多年生雑草	収穫14日前まで (畦間処理)	300~500	100~150	2回以内	2回以内
さとうきび *3		畦間・株間処理	300	100	2回以内	2回以内
茶	一年生雑草	茶(幼木)				
小麦 大麦	一年生雑草	耕起又はは種前 収穫7日前まで	300~500	100 s 150	1回	4回以内 (は種後は 3回以内)
水田作物	一年生雑草	耕起前	300~500		1回	1回
水田作物(水田刈跡)*3	一年生雑草 多年生雑草	—	500~1000	100 s 150	2回以内	3回以内
水田作物(水田畦畔)*3	一年生雑草 多年生雑草	大土寄期畦畔・畦間処理 畦間処理	200~500		1回	1回
たばこ	一年生雑草	—	500~1000	100 s 200	3回以内	3回以内
花き類・観葉植物	一年生雑草	—				
樹木類	多年生雑草	—				
樹木等	多年生雑草	—				

*1:使用方法は雑草茎葉散布です。ただし、樹木等は植栽地を除く樹木の周辺地に雑草茎葉散布です。 *2:収穫物への残留回避のため、本剤とグルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数を示します。 *3:さとうきびの適用場所は圃場内の周縁部です。小麦、大麦の適用場所は圃場内の周縁部です。水田作物(水田刈跡)の適用場所は水田刈跡です。水田作物(水田畦畔)の適用場所は水田畦畔です。樹木等の適用場所は公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等です。

■使用上の注意事項

▲効果・薬害等の注意

- 散布直後の降雨は効果を減するので、天候をよく見きわめてから散布してください。
- 本剤は雑草の生育期に有効ですが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣りますので、草丈30cm程度を目安に時期を失しないように、薬液が雑草全体によく付着するようにていねいに散布してください。
- 植物に薬液が付着すると薬害を生じますので、散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布してください。特に野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布してください。
- 茶(幼木)に使用するときは樹高30cm以上、雑草の草丈20cm以下で処理してください。処理当年には摘採しないでください。薬液が付着した茶葉には黄化、褐変、落葉などの症状を生じることがありますので、噴口を低くして芽や新葉にかからないように注意して散布してください。
- アスパラガスの立茎栽培で使用する場合は、萌芽している若茎に薬害を生じるおそれがありますので、散布後新たに萌芽した若茎を用いて立茎してください。
- 蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください(蚕害)
- 散布液を調整した容器及び散布器具は使用後十分に洗ってください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

▲安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)
- 皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください(刺激性)
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長スポン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園、堤とう等を使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう周囲に立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 魚毒性・・・養魚田周辺での使用には注意してください(魚類)
- 保管・・・密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷凍所で保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。● 空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水は散布液調整に用いるなど、ほ場で使用してください。

Facebook

X(旧Twitter)

YouTube



三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>



ZAXA 検索