

水稲用初・中期一発処理除草剤

ゼータジャガー®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

狙った雑草は、逃さない。

プロピリスルフロン
ベントキサゾン
フェンキノトリオン

3成分

オモダカ
クログワイ コウキヤガラ



本剤は(公財)日本植物調節剤研究協会でのA-1S区分・難防除雑草一発処理(オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ)で判定を取得しています。



ノビエ4葉期まで処理可能!!



オモダカに優れた効果!!



クログワイに長期残効!!

◆3成分の一発剤 ◆ノビエ4葉期に優れた効果 ◆多年生難防除雑草に卓効



ホタルイ



ミズアオイ



コナギ



アゼナ



除草剤分類 27, 2, 14

ゼータジャガー1キロ粒剤の適用と使用方法

農林水産省登録 第24470号

【有効成分】 フェンキナトリオン…3.0%
プロピスルフロ…0.90% ペントキサゾン…2.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、エゾノサヤヌカガサ、オモダカ クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg /10a	1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで			
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			湛水散布

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	ヘラ葉期まで
クログワイ	草丈15cmまで
コウキヤガラ	草丈30cmまで
セリ	再生期まで

ゼータジャガーフロアブルの適用と使用方法

農林水産省登録 第24469号

【有効成分】 フェンキナトリオン…5.7%
プロピスルフロ…1.7% ペントキサゾン…3.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、エゾノサヤヌカガサ、オモダカ クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	500mℓ /10a	1回	原液湛水散布
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈25cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	ヘラ葉期まで
クログワイ	草丈15cmまで
コウキヤガラ	草丈30cmまで
セリ	再生期まで

ゼータジャガージャンボの適用と使用方法

農林水産省登録 第24471号

【有効成分】 フェンキナトリオン…15.0%
プロピスルフロ…4.5% ペントキサゾン…10.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、エゾノサヤヌカガサ、オモダカ クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (200g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる
直播水稻	一年生雑草 及び ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	ヘラ葉期まで
クログワイ	草丈15cmまで
コウキヤガラ	草丈25cmまで
セリ	再生始期まで

有効成分の総使用回数
(3剤型共通)

フェンキナトリオンを含む農薬の総使用回数	2回以内	プロピスルフロを含む農薬の総使用回数	2回以内	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数	2回以内
----------------------	------	--------------------	------	--------------------	------

(上記の内容はすべて2022年4月現在の登録内容)

使用上の注意事項

【3剤型共通の使用上の注意事項】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに、時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果がふれるので、必ず適期に散布するようにしてください。
- 稲の根が露出する条件では葉害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用をさけてください。
- 田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用してください。
- 本剤はその殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を障害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いくさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は異常気象の場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 散布後は水管理に注意してください。

【1キロ粒剤・フロアブルの使用上の注意事項】

- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3～5cm)で、まきむらが生じないように均一に散布してください。また、極端な浅水や深水での使用はさけてください。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化および植付作業は行わないで行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に注意してください。
- 以下のような条件下では葉害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
 - ①砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)。
 - ②軟弱な苗を移植した水田。 ③極端な浅植えの水田。
- 散布田の田面水を他の作物に湛水しないで行ってください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

【1キロ粒剤の使用上の注意事項】

- 散布の際は農業用マスク、手袋、不透水性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

【フロアブルの使用上の注意事項】

- 使用前には容器を軽く振ってください。
- 散布の際は不透水性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

【ジャンボの使用上の注意事項】

- 藻類または表層はく離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用してください。
- 苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平化および植付作業は行わないで行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に注意してください。
- 処理に当たっては、水の出入りを止めて5～6cmの湛水状態に保ってください。処理後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じてください。
- 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- 藻や浮き草が多発している水田では拡散が不十分となり、部分的な葉害や効果不足の可能性があるので使用をさけてください。
- バックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないよう注意してください。
- 以下のような条件下では葉害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
 - ①砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)。
 - ②軟弱な苗を移植した水田。 ③極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の湛水に用いないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
 - ①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - ②かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

04R4D22Z42:ZS

2022年4月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐくへ
scc GROUP



動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サービス ☎ 0570-058-669
住友化学アグロ事業部



住友化学