

肥効調整型肥料

ツバメコート[®]シリーズ



土に
かえるまで

硫黄被膜

肥料成分

微生物により、
ワックスが分解。



微生物が、
被膜を分解。


チッ素成分が
少しずつ
溶出する。



被覆はさらに
分解され、
崩壊する。




被覆は耕耘
などで
コナゴナに
なる。



硫黄の被膜が
肥料成分となる。

硫黄被覆肥料
の構造



1. 特長

- 緩効性窒素（サンウレア・硫黄被覆尿素）は微生物分解性で、土壤中の自然環境下に未分解の樹脂等が残存することなく、環境保全対策の推進に役立ちます。
- 当社独自の緩効性窒素をブレンドすることにより、初中期から生育後半まで肥効がスムーズに持続する肥効調節型肥料です。
- 側状施肥機での施肥に当たっては施肥量ダイヤルの調整を行い、また実際の施肥具合を確かめながら田植作業を行ってください。
- 高チッ素L型肥料ではリン酸・カリの施用量が少なくなりますので、地力を消耗させないようPK化成の併用をお勧めいたします。


2. 成分

銘柄	保証成分(%)				嵩比重	内容量(kg)	指定配合 記号
	チッ素	リン酸	カリ	苦土			
ツバメコート486	14	18	16	2	0.9	20	A744
ツバメコート572	15	17	12	2	0.9	20	A746
ツバメコート070	20	17	10		0.9	15	A166
ツバメコート400	24	10	10		0.8	15	A319
ツバメコート500	25	10	10		0.8	20	A745
ツバメコート799	27	9	9		0.8	15	A747

3. 施肥量とチッ素成分量 (Kg)

銘柄	施肥量	チッ素成分量	施肥量	チッ素成分量	施肥量	チッ素成分量
ツバメコート486	20	2.80	40	5.60	60	8.40
ツバメコート572	20	3.00	40	6.00	60	9.00
ツバメコート070	15	3.00	30	6.00	45	9.00
ツバメコート400	15	3.60	30	7.20	45	10.80
ツバメコート500	20	5.00	40	10.00	50	12.50
ツバメコート799	15	4.05	30	8.10	45	12.15

4. 肥効イメージ



製造

サンアグロ
SUN AGRO CO., LTD. ●●●

取扱