

省力散布

代かき作業と除草作業が同時にできる



水田用
初期除草剤

デルカット® 乳剤

1.5ℓ入り「滴下美人II」専用ボトル

滴下美人
専用



セットで使用
して下さい



デルカット乳剤専用の滴下装置「滴下美人II」を使用することにより、代かき作業をしながらデルカット乳剤の散布が可能になります。

※製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

手散布ができるお手軽な
500mlボトルもあります。







特長 代かき時に混和处理するデルカット乳剤は、雑草の発生前に処理層を形成しますので安定した効果が期待できます。



特長 デルカット乳剤の有効成分は散布後きわめて短時間で水中濃度が低下し、土壌に吸着され処理層を形成します。



雑草発生前に散布できるため、一発処理剤或いは中期剤・後期剤と体系で使用するにより、雑防除雑草や多年生雑草の散布適期を逃さずにタイミングよく的確に防除できます。



〈試験方法〉

手散布: 整地板前処理 処理時風速: 2m/秒
機械散布: 湛水条件 4~5cm 理論初濃度: オキサジアゾン 0.8ppm
ブタクロール 1.2ppm

散布方法


トラクターに「滴下美人Ⅱ」(代かき同時滴下装置)を装着し、代かき作業と同時に滴下散布します。



詳しい使い方については、「滴下美人Ⅱ」付属の取扱説明書をご覧ください。

散布時期

代かきの仕上げ(最後)の時に行ってください。



デルカット乳剤は残効が長く安定した効果を示しますので、後に使用中後期剤や一発剤の散布にもゆとりができます。

※雑草の発生状況に応じて体系除草を行ってください。

登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	オキサジアゾンを含む農薬の総使用回数	ブタクロールを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ	植代時 (移植4日前まで)	500 mL / 10a	1回	植代時に原液のまま散布し混和する。 または、 植代直後原液のまま散布し、ただちに整地板で均平作業を行う。	1回	2回以内
	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ		250~350 mL / 10a (少量散布)				
いぐさ	水田一年生雑草 スズメノテッポウ	植代後~ スズメノテッポウ3葉期 またはノビエ1.5葉期	300~500 mL / 10a		原液湛水散布		1回

※雑草害をもたらす栽培目的以外のイネの防除に使用する場合は、発生前が有効なので散布適期を失ないように散布してください。
また、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。

(2024年2月現在)

使用上の注意事項

- クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さないで、有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。
- 散布の際は水の出入りを止めて、湛水状態でい、薬剤が十分拡散するよう均一に散布してください。また、強風時の散布は避けてください。
- 水田の代かき、均平はていねいに、浮遊物のフラクズなどのごみはできるだけ取り除いてください。
- 移植水稲に使用する場合、以下の点に注意してください。
 - ①散布後4日間は落水、かけ流しはしないでください。
 - ②移植時に落水しないよう、代かき時に必要以上の水を水田に入れないでください。
- いぐさに使用する場合、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 移植後の深水は、葉害を生ずるおそれがあるので注意してください。
- 軟弱苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)及び著しいガス発生田では、葉害を生ずるおそれがあるので使用しないでください。
- 散布液の飛散によって、自動車やトラクターの塗装等へ影響を与えないよう十分注意してください。
- 眼に入るときわめて強い刺激がありますので、作業用メガネを着用してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

取扱