

水稲用殺虫殺菌剤

トライエミリア[®]

フロアブル

新規殺虫成分
(フルピリミン)
を配合!

黄金色の大地は、一心同体で守り切る。



いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い効果!
地上散布のほか、少量散布、無人航空機による散布が可能!
殺虫成分フルピリミンはミツバチなどの有用昆虫に影響が小さい!

水稲用殺虫殺菌剤

トライ[®] エミリア[®] フロアブル

有効成分：フルピリミン…10.0% テブフロキン…15.0% 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

1

トライがいもち病、穂枯れに高い効果を発揮!!

殺菌成分のテブフロキンは、1成分で予防と治療のダブルの効果を持ち、いもち病の蔓延を防ぎます。

2

エミリアがウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い効果を発揮!!

殺虫成分のフルピリミンは新規有効成分で既存剤に抵抗性を持った害虫にも効果を発揮します。

3

殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さい!!

ミツバチのほか、多くの有用昆虫や天敵類に対して影響はほとんどありません。

適用病害虫と使用方法

2024年3月27日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	テブフロキンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 穂枯れ（ごま葉枯病菌）	1000倍	60～150 ℓ/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布 無人航空機 による散布	3回以内 （直播では種時 又は移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内）	2回以内
	イネドロオウムシ	250倍	25ℓ/10a					
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	8倍	0.8ℓ/10a					

試験成績

●ウンカ類（ヒメトビウンカ）

一般社団法人日本植物防疫協会 2022年 茨城研究所

品 種：コシヒカリ

移 植 日：4月28日


発生状況：中発生

処理月日：6月22日

処 理 量：125ℓ/10a

調査月日：6月29日

調査方法：

3区50株あたりの生息虫数を
調査

●斑点米カメムシ類

一般社団法人日本植物防疫協会 2021年 宮崎試験場

品 種：ヒノヒカリ

移 植 日：6月28日

発生状況：少発生


処理月日：8月31日および9月7日

処 理 量：8月31日 94ℓ/10a

9月7日 140ℓ/10a

調査月日：10月1日

調査方法：

3区中央部の20株5000粒につ
いて斑点米率を調査

トライエミリアフロアブルは各害虫に対し、高い効果が認められた。

使用上の注意事項

⚠効果・薬害等の注意

- 使用の際は容器をよく振って均一な状態にして使用してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布してください。
- 本剤を無人航空機による散布で使用する場合には次の注意事項を守ってください。
- ①散布液の飛散によって他の動植物等への危被害あるいは自動車の塗装などへ被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ②微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
- ③各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
- ④散布中薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
- a) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。
- b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は、河川等に流さないでください。
- 本田の水稲に対して希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を用いてください。

- 周辺の作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の指示を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の指示を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用量に合わせて薬液を調整し、使いきってください。●空容器は農場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用して下さい。●防除日誌をつけましょう。

お問い合わせ/ご注文は

三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>

最新の登録内容

TRYEM-001 Zenshin 2405