

ブラシントツ[®]H

粉剤DL

いもち病、
カメムシ類を
一刀両断!!



農林水産省登録 第21218号

斑点米を抑えます
その他病害虫にも



斑 点 米



ホソハリカメムシ



アカヒゲホソミドリカスミカメ



アカスジカスミカメ



トゲシラホシカメムシ

いもち病にも!



いもち病



ごま葉枯病



セジロウンカ



ツマグロヨコバイ



クモヘリカメムシ



ミナミアオカメムシ

ブラシントツは住友化学(株)の登録商標

ブラシダントツH 粉剤 DL

殺虫剤分類 4A
殺菌剤分類 U14, 16.1

クロチアニジン 0.50%
フェリムゾン 2.0%
フサライド 1.5%

特長

1 主要なカメムシ類に対して優れた効果

有効成分(クロチアニジン)含量が高く、アカヒゲホソミドリカスミカメ、オオトゲシラホシカメムシ、クモヘリカメムシなど幅広いカメムシに適確な効果と残効性を発揮します。

2 水稲の主要害虫といもち病にも優れた効果

ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、イネツトムシや、いもち病などに対しても高い効果を発揮します。

適用と使用法

2020年11月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	3~4kg /10a	収穫 7日前まで	2回以内	散布	4回以内 (直播では種時又は 移植時までの処理は 1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計3回以内)	2回以内	3回以内

上手な使い方

出穂期 穂 揃 い 期 ~ 乳 熟 期

いもち病適期


散布

※いもち病の防除適期に合わせた
散布でもカメムシ類の防除が可能

カメムシ類に対する残効


防除効果

アカヒゲホソミドリカスミカメ




品 種: あきたこまち 2002年 秋田県農業試験場
移 植: 5月14日
出 穂 期: 8月5日
発生状況: アカヒゲホソミドリカスミカメ 中発生
散 布: ブラシダントツH粉剤DL 8月5日(出穂期)
A粉剤DL 8月17、28日の2回散布
調 査: 9月13日に刈り取り、精玄米の斑点米数を調査

アカスジ・クモヘリカメムシ等



品 種: コシヒカリ 2002年 兵庫県
移 植: 5月3日 農林水産技術総合センター
出 穂 期: 7月28日
発生状況: アカスジ・クモヘリカメムシ 中発生
散 布: ブラシダントツH粉剤DL 7月28日(出穂期)
B粉剤DL 8月5日の1回散布
調 査: 8月23日に採穂し、精玄米の斑点米数を調査

いもち病



品 種: コシヒカリ 2001年 新潟県植物防疫協会
移 植: 5月12日
出 穂 期: 8月6日
発生状況: 穂いもち 少発生
散 布: 8月5日(出穂1日前)と8月12日の2回散布
調 査: 8月31日 発病程度別穂数/1区50株より、防除価算出

使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- たばこ、けいとう及び幼植物のだいず・あすき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の養蚕にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするのと同時に衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

02R11K20B28:ZS

2020年11月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学



動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サイト 農薬力 <https://www.1-nouryoku.com>
住友化学アグロ事業部

