



ノビエをはじめホタルイ、ミズガヤツリ、マツバイまで  
広範囲の雑草に優れた効果を示し、長期間持続します。

## 水稲用初期除草剤

# マーシエット<sup>®</sup> ジャンボ<sup>®</sup> 1キロ粒剤

農薬登録番号 第20825号

農薬登録番号 第20826号



500g (10 パック入り)

### 使い方

- 散布時期** 雑草の発生前から発生始期に有効ですので、ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布してください。
- 使用量** 1 パック (50g) → 1 アール 10 パック (500g) → 10 アール  
※ホタルイ、ミズガヤツリは発生始期まで、ヘラオモダカ、コナギは発生前に散布してください。
- 使用方法** 水田に小包装 (パック) のまま投げ入れる。  
※パックは水溶性のフィルム (WSB) です。ぬれた手で扱わないでください。  
※パックは破らずにそのまま投げ込んでください。




田植同時散布も  
できます

### 使い方

- 散布時期** 雑草の発生前から発生始期に有効ですので、ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布してください。
- 散布量** 10 アール当り 1 kg (1 袋) 均一に散布してください。  
※ホタルイ、ミズガヤツリは発生始期まで、ヘラオモダカ、コナギは発生前に散布してください。

### 上手な使い方



本剤は雑草の発芽・発生前から発生始期の処理で有効です。

®：登録商標



日産化学



近年問題となっているS U抵抗性ホタルイ、アゼナ、ミズアオイ、コナギなどにも優れた効果を発揮します。

## 登録内容

本資料は2018年7月現在の知見に基づいています。

### マーシェット<sup>®</sup>1キロ粒剤

有効成分：ブタクロール/10.0% 毒性：普通物※

| 作物名  | 適用雑草名                                             | 使用時期                                           | 使用量     | 本剤の使用回数 | 使用方法       | ブタクロールを含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草<br>及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ミズガヤツリ<br>ヘラオモダカ | 移植時                                            | 1kg/10a | 1回      | 田植同時散布機で施用 | 2回以内              |
|      |                                                   | 植代後～移植前7日<br>又は<br>移植直後～ノビエ1葉期<br>ただし、移植後30日まで |         |         | 湛水散布       |                   |

### マーシェット<sup>®</sup>ジャンボ

有効成分：ブタクロール /20.0% 毒性：普通物※

| 作物名  | 適用雑草名                                             | 使用時期                                               | 使用量                                   | 本剤の使用回数 | 使用方法                             | ブタクロールを含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草<br>及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ミズガヤツリ<br>ヘラオモダカ | 植代後～移植前7日<br>又は<br>移植後1日～ノビエ1葉期<br>ただし<br>移植後30日まで | 小包装<br>(パック)<br>10個<br>(500g)<br>/10a | 1回      | 水田に<br>小包装(パック)<br>のまま<br>投げ入れる。 | 2回以内              |


※本資料では「普通物」を「毒劇物」に該当しないものを指している通称として用いています。

## 使用上の注意

- 雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布してください。
- 苗の植付が均一になるよう、整地、代かきはていねいに行ってください。
- 1キロ粒剤散布の際は、通常の湛水深(3～5cm)でまきむらを生じないように均一に散布してください。
- ジャンボ剤散布の際は、水深を5cm以上保ってください。
- 散布後3～4日はそのままの湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 低温で長期にわたり雑草が発生する地域、代かきから移植までの期間が長い場合においては、移植後に使用する除草剤との体系で使用してください。



- 以下の水田では初期生育の抑制を生じる恐れがあるので使用を避けてください。



- 浅植えや植付精度不良などで根が露出していると、薬害を生ずる恐れがあるので注意すること。
- 散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温では、初期生育が抑制されるおそれがあるので使用しないでください。
- 活着遅延を生ずるような異常低温では、初期生育の抑制が生じるおそれがあるので、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>  
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)